


원프렙 1.38^산 (장정결제) 복용안내문

검사 3일 전부터	· 금기식품: 씨 있는 과일(딸기, 수박, 참외, 포도, 키위 등) 및 과일껍질, 잡곡밥, 흑미, 현미, 미역, 다시마, 나물, 버섯, 김치, 야채 샐러드 등은 절대 드시지 마십시오. · 권장식품: 흰쌀밥, 계란, 두부, 생선 등 부드러운 음식 위주로 드시되 과식은 피하십시오.
주의사항	식이조절이 잘 되지 않을 경우, 잔변으로 인해 검사의 정확도가 매우 떨어질 수 있으며 심한 경우에는 대장내시경 실패로 추후 장결제 재복용 후 검사를 재시행하여야 합니다.
Tip	1. 장정결제 복용 1~2시간 후부터 변이 나오기 시작하며, 찌꺼기 없이 투명한 노란 물변으로 나올 때 까지 충분히 대변을 보십시오. 2. 장정결제를 복용해도 배변이 되지 않을 경우에는 걷거나 가벼운 복부 마사지가 도움이 됩니다.

검진 시작시간	장정결제 복용시간	검사전날 식사 방법
오전	07:30~08:30	검사 당일, 오전 4시
늦은 오전	09:00~10:00	검사 당일, 오전 5시
	10:30~11:30	검사 당일, 오전 6시
오후	13:30~	검사 당일, 오전 9시
		- 아침·점심: 반찬 없이 흰 쌀죽을 드십시오. - 저녁: 금식 - 저녁: 반찬 없이 흰 쌀죽을 드십시오.

장정결제 복용방법



- ① 1차 조제: 물 230ml (한 컵)을 표시선까지 채운 후, A제 1포 + B제 1포를 녹여 **10분간 조금씩 나눠 복용**합니다.
- ② 이후 물 460ml(두 컵)을 **20분간 조금씩 나눠 복용**합니다.
 ↳ 이온헬퍼는 선택 사항으로, 물만 드시기 힘든 경우 물 230ml(한 컵)당 이온헬퍼 1포씩 섞어 드십시오.
- ③ 2차 조제: 물 230ml(한 컵)을 표시선까지 채운 후, A제 1포 + B제 1포를 녹여 **10분간 조금씩 나눠 복용**합니다.
- ④ 다시 물 460ml(두 컵)을 **20분간 조금씩 나눠 복용**합니다.
- ⑤ 마지막으로 거품 방지제 **가소콜**을 복용합니다.

※ 위 과정을 1시간 동안 완료합니다. (빨대를 사용해 1분에 두세 모금 속도로 천천히 복용하십시오.)