

씨엠쿨산® 복용안내문

검사 3일 전부터	· 금기식품: 씨 있는 과일(딸기, 수박, 참외, 포도, 키위 등) 및 과일껍질, 잡곡밥, 흑미, 현미, 미역, 다시마, 나물, 버섯, 김치, 야채 샐러드 등은 절대 드시지 마십시오. · 권장식품: 흰쌀밥, 계란, 두부, 생선 등 부드러운 음식 위주로 드시되 과식은 피하십시오.
주의사항	식이조절이 잘 되지 않을 경우, 잔변으로 인해 검사의 정확도가 매우 떨어질 수 있으며 심한 경우에는 대장내시경 실패로 추후 장결제 재복용 후 검사를 재시행하여야 합니다.
Tip	1. 장정결제 복용 2~3시간 후부터 변이 나오기 시작하며, 찌꺼기 없이 투명한 노란 물변으로 나올 때 까지 충분히 대변을 보십시오. 2. 장정결제를 복용해도 배변이 되지 않을 경우에는 걷거나 가벼운 복부 마사지가 도움이 됩니다.

검진 시작시간		장정결제 복용시간		검사전날 식사방법
		1차 복용	2차 복용	
오전	07:30 ~ 08:30	검사 전날, 오후 8시	검사 전날, 오후 9시	아침: 반찬없이 흰쌀죽
늦은 오전	09:00 ~ 12:00	검사 전날, 오후 8시	검사 당일, 오전 5시	점심: 반찬없이 흰쌀죽 저녁: 금식
오후	13:30 ~	검사 당일, 오전 6시	검사 당일, 오전 7시	저녁: 반찬없이 흰쌀죽



- ① 박스 안에 조제를 위한 일회용 용기(500ml)와 파우치 8개(A제 4개, B제 4개)가 들어있습니다.
- ② 용기에 A제 1포 + B제 1포 + 물 500ml를 넣고 섞어줍니다.
- ③ 아래 표를 참고하여 검진 시작 시간에 따라 정해진 분량만큼 시간 내 복용합니다.

오전	검사 전날 오후 8시부터 상기 그림의 ①~⑥번 순서대로 모두 복용
늦은 오전	검사 전날 오후 8시부터 1차 복용 시작, [A제 1포 + B제 1포 + 물 500ml] x 2회 반복, 추가로 물 1,000ml (1L) 복용 + 검사 당일 오전 5시부터 2차 복용 시작, [A제 1포 + B제 1포 + 물 500ml] x 2회 반복, 추가로 물 1,000ml (1L) 복용 + 엔도콜 복용
오후	검사 당일 오전 6시부터 상기 그림의 ①~⑥번 순서대로 모두 복용