


크린뷰올산 (장정결제) 복용안내문


검사 3일 전부터	- 금기식품: 씨 있는 과일(딸기, 수박, 참외, 포도, 키위 등) 및 과일껍질, 잡곡밥, 흑미, 현미, 미역, 다시마, 나물, 버섯, 김치, 야채 샐러드 등은 절대 드시지 마십시오. - 권장식품: 흰쌀밥, 계란, 두부, 생선 등 부드러운 음식 위주로 드시되 과식은 피하십시오.
주의사항	식이조절이 잘 되지 않을 경우, 잔변으로 인해 검사의 정확도가 매우 떨어질 수 있으며 심한 경우에는 대장내시경 실패로 추후 장결제 재복용 후 검사를 재시행하여야 합니다.
Tip	1. 장정결제 복용 2~3시간 후부터 변이 나오기 시작하며, 찌꺼기 없이 투명한 노란 물변으로 나올 때 까지 충분히 대변을 보십시오. 2. 장정결제를 복용해도 배변이 되지 않을 경우에는 걷거나 가벼운 복부 마사지가 도움이 됩니다.

검진 시작시간		장정결제 복용시간	
		1차 복용	2차 복용
오전	07:30~	검사 전날, 오후 8시	검사 당일, 오전 5시
검사 전날 식사 방법	- 아침·점심: 반찬 없이 흰 쌀죽을 드십시오. 이후 검사 당일까지 장정결제 + 물 이외에는 드시지 마십시오. - 저녁: 금식		
오후	13:30~	검사 당일, 오전 5시	검사 당일, 오전 8시
검사 전날 식사 방법	- 저녁: 반찬 없이 흰 쌀죽을 드십시오. 이후 검사 당일까지 장정결제 + 물 이외에는 드시지 마십시오.		



- ① A제 2포와 B제 2포를 물 500mL를 넣고 흔들어 가루를 완전히 녹입니다.
- ② 조제한 크린뷰올산 500mL를 15분 간격으로 30분 동안 천천히 복용합니다.
- ③ 추가적인 물 1L 이상을 꾸준히 섭취하여 탈수를 예방합니다.

※ 요약 ※ 크린뷰올산 500mL → 물 1L



- ④ A제 2포와 B제 2포를 물 500mL를 넣고 흔들어 가루를 완전히 녹입니다.
- ⑤ 조제한 크린뷰올산 500mL를 15분 간격으로 30분 동안 천천히 복용합니다.
- ⑥ 추가적인 물 1L 이상 섭취 후 마지막에 엔도콜을 복용합니다. 이후, 물 포함 금식

※ 요약 ※ 크린뷰올산 500mL → 물 1L → 엔도콜